

| Echelle d'Observation Comportementale modifiée <i>Noter pour chaque item la situation caractérisant au mieux le patient.</i> | | | Score |
|--|----------------------------|-------------|--------------|
| Pousse des gémissements, des plaintes (Expression de pleurs, de gémissements, de cris avec ou sans larmes) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Front plissé, crispation du visage (Expression du visage, du regard, et mimiques douloureuses) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Attitudes antalgiques visant à la protection d'une zone en position de repos "assis ou allongé" (Recherche active d'une posture inhabituelle ou adoption spontanée et continue d'une position de protection d'une zone présumée douloureuse) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Mouvements précautionneux (A la sollicitation, réaction de défense coordonnée ou non d'une zone présumée douloureuse, ou évitement de la mobilisation d'une zone présumée douloureuse) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Agressivité/agitation ou mutisme/prostration (Communication intensifiée traduite par une forte agitation ou absence/refus de communication traduit par une absence de mouvements ou replis sur soi) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Score total <i>Le patient est considéré comme douloureux si le score total est supérieur ou égal à 2.</i> | | | /10 |

| Echelle d'Observation Comportementale modifiée <i>Noter pour chaque item la situation caractérisant au mieux le patient.</i> | | | Score |
|--|----------------------------|-------------|--------------|
| Pousse des gémissements, des plaintes (Expression de pleurs, de gémissements, de cris avec ou sans larmes) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Front plissé, crispation du visage (Expression du visage, du regard, et mimiques douloureuses) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Attitudes antalgiques visant à la protection d'une zone en position de repos "assis ou allongé" (Recherche active d'une posture inhabituelle ou adoption spontanée et continue d'une position de protection d'une zone présumée douloureuse) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Mouvements précautionneux (A la sollicitation, réaction de défense coordonnée ou non d'une zone présumée douloureuse, ou évitement de la mobilisation d'une zone présumée douloureuse) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Agressivité/agitation ou mutisme/prostration (Communication intensifiée traduite par une forte agitation ou absence/refus de communication traduit par une absence de mouvements ou replis sur soi) | Absent Faible Marqué | 0 1 2 | |
| Score total <i>Le patient est considéré comme douloureux si le score total est supérieur ou égal à 2.</i> | | | /10 |

Travail de validation de l'EOC modifiée mené par l'équipe de l'Unité Soutien Douleur du CHU de Bordeaux et le CCECQA en 2008 – www.ccecqa.asso.fr : ajout de l'item « Agressivité/agitation ou mutisme/prostration » ; résultats validant l'EOC modifiée ; seuil de douleur à 2 (≥ 2) pour un score sur 10.

Source : Boureau F, Luu M, Héricord P. Evaluation de l'intensité de la douleur au service d'accueil et des urgences. Intérêt des échelles d'évaluation. Réan Urg. 1993;2(3bis):331-335.